

多発性骨髄腫

レジメン名称	薬剤（一般）名	用量	投与時間	投与日	1コースの目安	催吐リスク
BD	ボルテゾミブ デキサメタゾン	1.3mg/m ² 20mg	皮下注 分1	1, 4, 8, 11日目 1, 4, 8, 11日目	21日	軽
BLd	ボルテゾミブ レナリドミド デキサメタゾン	1.3mg/m ² 25mg 40mg	皮下注 分1 分1	1, 4, 8, 11日目 1-14日目 1, 8, 15日目	21日	軽
DLd (1-2コース目)	ダラツムマブ レナリドミド デキサメタゾン	1800mg 25mg 40mg	皮下注 分1 分1	1, 8, 15, 22日目 1-21日目 1, 8, 15, 22日目	28日	軽
DLd (3-6コース目)	ダラツムマブ レナリドミド デキサメタゾン	1800mg 25mg 40mg	皮下注 分1 分1	1, 15日目 1-21日目 1, 8, 15, 22日目	28日	軽
DLd (7コース目以降)	ダラツムマブ レナリドミド デキサメタゾン	1800mg 25mg 40mg	皮下注 分1 分1	1日目 1-21日目 1, 8, 15, 22日目	28日	軽
DBLd (1-4コース目)	ダラツムマブ ボルテゾミブ レナリドミド デキサメタゾン	1800mg 1.3mg/m ² 25mg 40mg	皮下注 皮下注 分1 分1	1, 8, 15日目 1, 4, 8, 11日目 1-14日目 1, 8, 15日目	21日	軽
DBLd (5-6コース目)	ダラツムマブ ボルテゾミブ レナリドミド デキサメタゾン	1800mg 1.3mg/m ² 25mg 40mg	皮下注 皮下注 分1 分1	1日目 1, 4, 8, 11日目 1-14日目 1, 8, 15日目	21日	軽
DBLd (7コース目以降)	ダラツムマブ レナリドミド デキサメタゾン	1800mg 25mg 40mg	皮下注 分1 分1	1日目 1-21日目 1, 8, 15, 22日目	28日	軽
D-MPB (1コース目)	ダラツムマブ ボルテゾミブ メルファラン プレドニゾロン	1800mg 1.3mg/m ² 9mg/m ² 60mg/m ²	皮下注 皮下注 分1 分1	1, 8, 15, 22, 29, 36日目 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32日目 1-4日目 2-4日目	42日	軽
D-MPB (2-9コース目)	ダラツムマブ ボルテゾミブ メルファラン プレドニゾロン	1800mg 1.3mg/m ² 9mg/m ² 60mg/m ²	皮下注 皮下注 分1 分1	1, 22日目 1, 8, 22, 29日目 1-4日目 2-4日目	42日	軽
D-MPB (10コース目以降)	ダラツムマブ	1800mg	皮下注	1日目	28日	軽