

泌尿器癌

臓器	レジメン名称	薬剤（一般）名	用量	投与時間	投与日	1コースの目安	催吐リスク
膀胱 尿路上皮	CDDP+GEM	ゲムシタビン シスプラチン	1000mg/m ² 70mg/m ²	30分 1時間30分	1, 8, 15日目 2日目	28日	高
	CBDCA (day1)+GEM	ゲムシタビン カルボプラチン	1000mg/m ² AUC : 5	30分 1時間	1, 8, 15日目 1日目	28日	高（中）
	CBDCA (day2)+GEM	ゲムシタビン カルボプラチン	1000mg/m ² AUC : 5	30分 1時間	1, 8, 15日目 2日目	28日	高（中）
	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	200mg	30分	1日目	21日	最小
	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	400mg	30分	1日目	42日	最小
	ピラルビシン膀胱注	ピラルビシン	30mg	膀胱注	1日目		最小
	Avelumab	アベルマブ	10mg/m ²	1時間	1日目	14日	最小
前立腺	DTX+PSL	ドセタキセル プレドニゾン	75mg/m ² 10mg	1時間 分2	1日目 連日	21日	軽
	Cabazitaxel	カバジタキセル	25mg/m ²	1時間	1日目	21日	軽