

膵癌

レジメン名称	薬剤（一般）名	用量	投与時間	投与日	1コースの目安	催吐リスク
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	1, 8, 15日目	28日	軽
GEM+S-1	ゲムシタビン S-1	1000mg/m ² 80mg/m ²	30分 分2	1, 8日目 1-14日目	21日	軽
FOLFOIRINOX	オキサリプラチン レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル（急速） フルオロウラシル（持続）	85mg/m ² 200mg/m ² 180mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	2時間 2時間 1時間30分 3分 46時間	1日目 1日目 1日目 1日目 1日目	14日	高
mFOLFIRINOX	オキサリプラチン レボホリナート イリノテカン フルオロウラシル（持続）	85mg/m ² 200mg/m ² 150mg/m ² 2400mg/m ²	2時間 2時間 1時間30分 46時間	1日目 1日目 1日目 1日目	14日	高
nabPTX+GEM	nab-パクリタキセル ゲムシタビン	125mg/m ² 1000mg/m ²	30分 30分	1, 8, 15日目 1, 8, 15日目	28日	中
nal-IRI+5FU/l-LV	イリノテカン リポソーム製剤 レボホリナート フルオロウラシル（持続）	70mg/m ² 200mg/m ² 2400mg/m ²	1時間30分 2時間 46時間	1日目 1日目 1日目	14日	中