

甲南医療センター 臨床指標 2024年度

項目


- ・ 入院患者の転倒・転落発生率
- ・ 入院患者の転倒・転落による損傷発生率（損傷レベル2以上）
- ・ 入院患者の転倒・転落による損傷発生率（損傷レベル4以上）
- ・ 65歳以上の入院患者における転倒・転落発生率
- ・ 新規圧迫損傷（褥瘡）発生率
- ・ 新規医療関連機器圧迫創傷（MDRPI）発生率
- ・ 持ち込み圧迫創傷（褥瘡）
- ・ 紹介割合・逆紹介割合
- ・ 救急車・ホットライン応需率
- ・ 退院後4週間以内の予定外再入院割合
- ・ 退院後7日以内の予定外再入院割合
- ・ 非心原性脳梗塞（TIA含む）患者の入院2日目までの抗血小板療法施行割合
- ・ 非心原性脳梗塞（TIA含む）患者の入院中の抗血小板療法施行割合
- ・ 脳梗塞患者のスタチン処方割合
- ・ 脳梗塞の診断で入院した患者への入院後早期リハビリ治療実施割合
- ・ 総合指標（Composite Measures） 【脳梗塞】
- ・ 1か月間・100床あたりのインシデント・アクシデント報告件数
- ・ 全報告中医師による報告の占める割合
- ・ 職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率
- ・ 糖尿病・慢性腎臓病を併存症に持つ患者への栄養管理実施割合
- ・ カルバペネム・ニューキノロン・抗MRSA薬使用時の血液培養実施率
- ・ カルバペネム・ニューキノロン・抗MRSA薬使用までの培養検査実施率
- ・ 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合
- ・ 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合（生後28日未満）
- ・ 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合（生後28日～2歳未満）
- ・ 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合（2歳～6歳未満）
- ・ 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合（6歳以上）
- ・ 脳卒中患者に対する地域連携の実施割合
- ・ 大腿骨頸部骨折患者に対する地域連携の実施割合
- ・ 大腿骨頸部骨折の早期手術割合
- ・ 大腿骨転子部骨折の早期手術割合
- ・ シスプラチンを含むがん薬物療法後の急性期予防的制吐剤の投与割合
- ・ 抗MRSA薬投与に対する薬物血中濃度測定割合
- ・ 薬剤管理指導実施割合（病棟薬剤業務実施加算有り）
- ・ アスピリン内服患者の退院時酸分泌抑制薬（PPI／H2RA）処方率

※日本病院会 QIプロジェクトより

一般-3-a 入院患者の転倒・転落発生率

分子:医療安全管理室ヘインシデント・アクシデントレポートが提出された転倒・転落件数
分母:入院延べ患者数


甲南医療センター / 全施設



一般-3-b 入院患者の転倒・転落による損傷発生率（損傷レベル2以上）

分子:医療安全管理室ヘインシデント・アクシデントレポートが提出された転倒・転落件数のうち損傷レベル2以上の件数
分母:入院延べ患者数


甲南医療センター / 全施設



一般-3-c 入院患者の転倒・転落による損傷発生率（損傷レベル4以上）

分子:医療安全管理室ヘインシデント・アクシデントレポートが提出された転倒・転落件数のうち損傷レベル4以上の件数
分母:入院延べ患者数


甲南医療センター / 全施設



一般-3-d 65歳以上の入院患者における転倒・転落発生率

分子:65歳以上の入院中の患者に発生した転倒・転落件数
分母:65歳以上の入院患者延べ数

甲南医療センター / 全施設




一般-4-a 新規圧迫創傷（褥瘡）発生率

分子：調査期間中にd2（真皮までの損傷）以上の院内新規圧迫創傷発生患者数

分母：調査期間初日（0時時点）の入院患者数＋調査期間に新たに入院した患者数

甲南医療センター / 全施設




一般-4-b 新規医療関連機器圧迫創傷（MDRPI）発生率

分子：調査月の新規医療関連機器圧迫創傷（MDRPI）発生患者数

分母：調査期間初日（0時時点）の入院患者数＋調査期間に新たに入院した患者数

甲南医療センター / 全施設




一般-4-c 持ち込み圧迫創傷（褥瘡）率

分子:入院後24時間以内に圧迫創傷発生の記録がある患者数

分母:調査期間に新たに入院した患者数

甲南医療センター / 全施設




一般-5 紹介割合

分子：(紹介患者数+救急患者数)

分母：初診患者数

甲南医療センター / 全施設




一般-6 逆紹介割合

分子:逆紹介患者数

分母: (初診+再診患者数)

全施設




— 中央値 —●— 平均値 ○ 外れ値

一般-8 救急車・ホットラインの応需率

分子:救急車で来院した患者数
分母:救急車受け入れ要請件数


甲南医療センター / 全施設



一般-13 退院後4週間以内の予定外再入院割合

分子: 前回退院から4週間以内に計画外で再入院した患者数
分母: 退院患者数


甲南医療センター / 全施設



一般-14 退院後7日以内の予定外再入院割合

分子: 前回退院から7日以内に計画外で再入院した患者数
分母: 退院患者数

甲南医療センター / 全施設




一般-15 非心原性脳梗塞(TIA含む)患者の入院2日目までの抗血小板療法施行割合

分子:入院2日目までに抗血小板療法を受けた患者数

分母:18歳以上の非心原性脳梗塞かTIAと診断された入院患者数


甲南医療センター / 全施設



一般-16 非心原性脳梗塞(TIA含む)患者の入院中の抗血小板療法施行割合

分子:入院中に抗血小板療法を受けた患者数
分母:18歳以上の非心原性脳梗塞かTIAと診断された入院患者数


甲南医療センター / 全施設



一般-17 脳梗塞患者のスタチン処方割合

分子:スタチンが投与された患者数
分母:脳梗塞で入院した患者数

甲南医療センター / 全施設




一般-18 脳梗塞の診断で入院した患者への入院後早期リハビリ治療実施割合

分子:入院後早期（3日以内）にリハビリテーション治療を受けた患者数

分母:18歳以上の脳梗塞と診断された入院患者数

甲南医療センター / 全施設




一般-20 統合指標(Composite Measures)

【脳梗塞】

分子:指標No. 15, 16, 17, 18の分子の合計

分母:指標No. 15, 16, 17, 18の分母の合計


甲南医療センター / 全施設



一般-21-a 1か月間・100床当たりのインシデント・アクシデント報告件数

分子: 調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント報告件数×100
分母: 許可病床数


甲南医療センター / 全施設



一般-21-b 全報告中医師による報告の占める割合

分子:分母のうち医師が提出したインシデント・アクシデント報告総件数
分母:調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント報告総件数


甲南医療センター / 全施設



一般-22 職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率

分子:インフルエンザワクチンを予防接種した職員数
分母:職員数

FY2024 - 甲南医療センター / 全施設



n 253


... 最小値 25.5 % - - 25%tile 83.4 % . - . 中央値 88.6 % — 平均値 87.2 % - - 75%tile 93.8 % - - 最大値 100.0 %

一般-23 糖尿病・慢性腎臓病を併存症に持つ患者への栄養管理実施割合

分子:特別食加算の算定回数

分母:18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入院患者の食事回数

甲南医療センター / 全施設




一般-24-a カルバペネム・ニューキノロン・抗MRSA薬使用時の血液培養実施率

分子:投与開始初日に血液培養検査を実施した患者数

分母:カルバペネム系注射薬、ニューキノロン系注射薬、抗MRSA薬（バンコマイシン内服は除く）投与を開始した入院患者数

甲南医療センター / 全施設




一般-24-b カルバペネム・ニューキノロン・抗MRSA薬使用までの培養検査実施率

分子:投与開始初日までに培養検査を実施した患者数

分母:カルバペネム系注射薬、ニューキノロン系注射薬、抗MRSA薬（バンコマイシン内服は除く）投与を開始した入院患者数

甲南医療センター / 全施設




一般-25-a 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合

分子:血液培養のオーダーが1日に2件以上ある日数 (人日)

分母:血液培養のオーダー日数 (人日)


甲南医療センター / 全施設



一般-25-b 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合（生後28日未満）

分子：血液培養のオーダーが1日に2件以上ある日数（人日）
分母：血液培養のオーダー日数（人日）（実施日が生後28日未満）

甲南医療センター / 全施設




-般-25-c 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合（生後28日～2歳未満）

分子：血液培養のオーダーが1日に2件以上ある日数（人日）

分母：血液培養のオーダー日数（人日）（実施日が生後28日以上2歳未満）

甲南医療センター / 全施設




一般-25-d 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合（2歳～6歳未満）

分子：血液培養のオーダーが1日に2件以上ある日数（人日）

分母：血液培養のオーダー日数（人日）（実施日が2歳以上6歳未満）


甲南医療センター / 全施設



一般-25-e 血液培養検査における同日2セット以上の実施割合（6歳以上）

分子：血液培養のオーダーが1日に2件以上ある日数（人日）
分母：血液培養のオーダー日数（人日）（実施日が6歳以上）

甲南医療センター / 全施設




一般-26-a 脳卒中患者に対する地域連携の実施割合

分子:地域連携に関する算定のある患者数

分母:脳卒中で入院した患者数

甲南医療センター / 全施設




一般-26-b 大腿骨頸部骨折患者に対する地域連携の実施割合

分子:地域連携に関する算定のある患者数

分母:大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨頸部の手術を受けた患者数

甲南医療センター / 全施設




一般-28-a 大腿骨頸部骨折の早期手術割合

分子:入院2日以内に手術を受けた患者数

分母:大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨折の手術を受けた患者数

甲南医療センター / 全施設




一般-28-b 大腿骨転子部骨折の早期手術割合

分子:入院2日以内に手術を受けた患者数

分母:大腿骨転子部骨折で入院し、大腿骨折の手術を受けた患者数


甲南医療センター / 全施設



一般-29 シスプラチンを含むがん薬物療法後の急性期予防的制吐剤の投与割合

分子:実施日の前日または当日に、5HT3受容体拮抗薬、NK1受容体拮抗薬およびデキサメタゾンの3剤すべてを併用した数
分母:18歳以上の患者で、入院にてシスプラチンを含む化学療法を受けた実施日数


甲南医療センター / 全施設



一般-30 抗MRSA薬投与に対する薬物血中濃度測定割合

分子:薬物血中濃度を測定された患者数
分母:TDMを行うべき抗MRSA薬を投与された患者数


甲南医療センター / 全施設



一般-31-a 薬剤管理指導実施割合(病棟薬剤業務実施加算の有る医療機関)

分子:薬剤管理指導を受けた患者数
分母:入院患者数

甲南医療センター / 全施設



一般-32 アスピリン内服患者の退院時酸分泌抑制薬（PPI/H2RA）処方率

分子:退院時に酸分泌抑制薬（PPI/H2RA）が退院時に処方された患者数

分母:退院時にアスピリン内服薬が処方されている18歳以上の患者数

甲南医療センター / 全施設

